

Z-ONE



Z-C3



ZAMAR

CONTROINDICAZIONE ASSOLUTA (Compressione):

- pazienti che sono fasi acute di **Flebite infiammatoria** nella regione interessata
- pazienti che presentano attualmente segni clinici che suggeriscono **Trombosi venosa profonda**, nella regione interessata
- pazienti che presentano una significativa **Arteriosclerosi** o altra patologia **Ischemica vascolare** nella regione interessata
- pazienti che manifestano significativi fattori di rischio o attuali segni clinici di **Embolia (ad es.: embolia polmonare, infarto, fibrillazione atriale, endocardite, infarto miocardio o placca ateromatosa embolica)**
- pazienti che presentano una patologia (**ad es.: Carcinoma**) in cui non è opportuno un aumento del ritorno venoso o linfatico nell'arto interessato
- pazienti che presentano **Iper-tonia** in fase decompensata nella regione interessata

CONTROINDICAZIONE ASSOLUTA (Crioterapia):

- pazienti che presentano una significativa **Compromissione vascolare** nella regione interessata (**ad es.: da congelamento pregresso, diabete, arteriosclerosi o ischemia**)
- pazienti che presentano note **Discrasie ematiche** le quali influiscono sull'insorgenza di **Trombosi** (**ad es.: Emoglobinuria parossistica a frigore, Crioglobulinemia, Anemia falciforme, Agglutinine a freddo nel siero**)

CONTROINDICAZIONE RELATIVA (Compressione):

- Pazienti che presentano una **Ferita aperta** nella regione interessata (la ferita deve essere medicata prima di usare il macchinario ZAMAR)
- pazienti che presentano una **Frattura acuta**, instabile (non trattata) nella regione interessata
- pazienti che soffrono di **Insufficienza cardiaca** o **Insufficienza cardiaca congestizia** (con associato edema negli arti o nei polmoni)

CONTROINDICAZIONE RELATIVA (Crioterapia):

- pazienti che soffrono del fenomeno di **Raynaud o Ipersensibilità al freddo (Orticaria a frigore)**
- pazienti che soffrono di **Iipertensione** o estrema **Ipotensione**
- pazienti che soffrono di **Diabete**
- pazienti che soffrono di **Compromissione della circolazione locale** o **Alterazione neurologica (inclusa paralisi o compromissione localizzata dovuta a vari interventi chirurgici)**. nella regione interessata
- pazienti che soffrono di **Artrite reumatoide** nella regione interessata

CONTROINDICAZIONE RELATIVA (Crioterapia - Compressione):

- pazienti che sono **minori di 18 anni** o che soffrono di **disabilità cognitive** o **barriere alla comunicazione**, sia temporanee (a causa di farmaci), sia permanenti
- pazienti che hanno una condizione di **Instabilità cutanea localizzata** (**ad es.: dermatite, legatura delle vene, gangrena, recente innesto cutaneo**) nella regione interessata